

Als Diabetiker gut informiert sein bedeutet, dass man weiß, welche Werte in der Behandlung angestrebt werden...



Stiftung in der Deutschen Diabetes-Stiftung

Therapieziele bei Diabetikern

Blutzucker	nüchtern nach dem Essen Langzeitblutzuckerwert	präprandial postprandial HbA1_c	< 100 mg/dl (5,5 mmol/l) < 140 mg/dl (7,7 mmol/l) < 7% (53 mmol/mol)
Körpergewicht/ Bauchumfang		Body Mass Index BMI Bauchumfang	Frauen 19-24 < 88 cm Männer 20-25 < 102 cm
Blutfette/ Triglyceride			< 150 mg/dl
Cholesterin	Herzkranke Diabetiker	HDL-Cholesterin LDL-Cholesterin LDL-Cholesterin	Frauen > 45 mg/dl < 100 mg/dl < 70 mg/dl Männer > 35 mg/dl < 100 mg/dl < 70 mg/dl
Blutdruck	Bei Nephropathie	systolisch/ diastolisch systolisch/ diastolisch	140/85 mmHg 130/85 mmHg

Zielwerte können nach Geschlecht, Alter und Krankheitsbild variieren

Wenn Sie unsicher sind, ob diese Werte auch auf Sie zutreffen, fragen Sie IHREN ARZT oder uns.